

મગફળીમાં છેયા / ચીઢો નિંદામણ

Cyperus rotundus (Purple nut sedge)

ઓળખ, નુકસાન અને સંકલિત નિયંત્રણ



1. ઓળખ



- સેજ વર્ગનું બહુવર્ષીય નિંદામણ.
- પાન પાતળા, લાંબા અને ચમકદાર લીલા હોય છે.
- થડ ત્રિકોણાકાર લાગે છે.
- છોડ મુંડમાં નીકળે છે.
- જમીન નીચે કાળી/ભૂરી ગાંઠો (ટયુબર) હોય છે.



2. નુકસાન



- પાણી, ખાતર, પ્રકાશ અને જગ્યા માટે ભારે સ્પર્ધા કરે છે.
- મગફળીના થડસાતના 30-45 દિવસમાં વધુ નુકસાન કરે છે.
- છોડની વૃદ્ધિ અટકાવે છે અને ઉત્પાદન ઘટાડે છે.
- ગાંઠો દ્વારા ફરી ઉગી આવવું હોવાથી નિયંત્રણ મુશ્કેલ બને છે.



4. ટૂંકમાં મુખ્ય ઉપાય

ઉનાળુ ઊંડી ખેડ + ગાંઠો કાઢી નાશ + સમયસર નીંદણ + પાક ફેરબદલી + જરૂર મુજબ યોગ્ય નિંદામણ નિયંત્રણ



3. સંકલિત નિયંત્રણ

1



ઉનાળુ ઊંડી ખેડ કરો અને ગાંઠો બહાર લાવી તડકામાં સુકાવો.

2



મૂળ અને ગાંઠો સહિત નિંદામણ કાઢી નાશ કરો.

3



20-25 દિવસે પ્રથમ નીંદણ અને 40-45 દિવસે બીજું નીંદણ કરો.

4



પાક ફેરબદલી અપનાવો.

5



શક્ય હોય ત્યાં મલ્ટિંગ કરો.

6



સારી રીતે સડેલું ખાતર જ વાપરો.

7



મગફળીમાં પ્રી-ઇમર્જન્સ તરીકે પેન્ડીમેથાલિન આધાન્ય દીતે વપરાય છે, પરંતુ છેવો પર અસર મર્યાદિત રહી શકે છે.

8



પોસ્ટ-ઇમર્જન્સ દવા માટે સ્થાનિક કૃષિ નિષ્ણાતની સલાહ લો.



વધુ માહિતી માટે
QR સ્કેન કરો



નોંધ: છેવો ગાંઠો દ્વારા ફરી ઉગી આવે છે, તેથી 2-3 સીઝન સુધી સતત સંકલિત નિયંત્રણ કરવાથી સારો પરિણામ મળે છે.

